

	Droga	Atuação no parasita	dose	Efeitos/cuidados
1	Mebendazol	<i>Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Necator americanus, A. duodenale. Taenia sp*</i>	100 mg (5 ml ou 1 comp.) 2 x por dia por 3 dias. Repetir após 2 a 3 semanas. *200 mg (10 ml ou 2 comp.) 2 x por dia por 3 dias. Repetir após 2 a 3 semanas.	Não usar em grávidas e lactantes. Cuidado nos menores de 1 ano.
2	Tiabendazol	<i>Strongyloides stercoralis</i>	25 a 50 mg/kg/d por 3 dias. Repetir após 7 dias	Não recomendado < 13,5 Kg
3	Albendazol	<i>Ascaris sp, Enterobius sp, T. trichiura, Ancilostomídeos, Strongyloides sp*, Taenia sp*. Giardia lamblia.**</i>	400 mg (10 ml ou 1 comp.), dose única. * por 3 dias ** por 5 dias	
4	Metronidazol	<i>Entamoeba histolytica e Giardia lamblia**</i>	30 a 40 mg /kg/dia dividido em duas ou três tomadas por 7 a 10 dias. Máximo 750 mg/dia (3 comp. De 250 mg) ** 15 a 20 mg/kg/dia por 5 a 7 dias	
5	Secnidazol	<i>Entamoeba histolytica e Giardia lamblia</i>	30 mg /kg/dia, dose única ou 1 ml/kg. Máximo de 2 g/dia	
6	Ivermectina	<i>Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura e Strongyloides sp*</i>	200 mcg/kg, dose única. Ou ½ comp. (3 mg) a cada 15 kg. Max 12 mg (2 comp.). * fazer 2 dias	Uso nos maiores de 15 kg ou acima dos 5 anos.
7	Nitaxozanida	Amplo espectro – helmintos e protozoários	0,375 ml (7,5 mg) /Kg até máx. 1 comp. (500 mg) - 2 x/dia (a cada 12 horas) por 3 dias	Acima de 1 ano
8	Pamoato de Pirvinio	<i>Enterobius vermicularis</i>	10 mg/kg ou 1 ml/kg de peso até máx. de 600 mg ou 60 ml, dose única. Repetir após 7 a 14 dias. Tratamento familiar.	Coloração vermelha nas fezes. Cuidados domicílio.
9	Praziquantel	<i>Taenia sp, Diphyllbothrium sp., Schistosoma mansoni *e Hymenolepsis nana e diminuta**</i>	5 a 10 mg/kg ou * 40 mg /kg ou ** 15 a 25 mg/kg, dose única. Dose máx. 600 mg ou 4 comp. de 150 mg ** 8 comp.	Poucos estudos em < 4 anos
10	Oxamniquine	<i>S. mansoni</i>	20 a 25 mg/kg/dia, administrados em duas doses em único dia, com intervalo de 3 a 8 h. máx. 1500 mg (6 caps. 250 mg)	

Adaptado de Tahan, Tratado de pediatria : SBP, 4. ed, 2017